

XLIX

- gatis, bracteis ovali-oblongis dense lanatis, radiato-patentibus, calycibus tomentosis, squamis margine fuscis. Perenne? Nobis.*
- Filago germanica.
gallica.
pyramidata.
arvensis.
- Evax pigmaea.
- Carpesium cernuum.
- Conyza squarrosa.
saxatilis.
rupestris.
- Erigeron graveolens.
canadense.
bonariense.
acre.
alpinum.
- Senecio vulgaris.
humilis.
sylvaticus.
foeniculaceus. *Corollis revolutis, foliis subvillosis, inferioribus petiolatis ovalibus sinuatis dentatis, superioribus amplexicaulibus oblongis, sinuato-pinnatifidis dentatis, summis lanceolatis denticulatis, radio paucifloro, floribus corymbosis. Annuus. Nobis. Jacobaea annua senecionis folio, foeniculi odore. Tilli hort. pisan. pag. 76. tav. 28. icon mala.*
montanus.
erucaefolius.
abrotanifolius.
Jacobaea.
aquaticus.
saracenicus.
- Senecio Doronicum.
baldensis.
- Cineraria campestris.
maritima.
bicolor.
- Aster acris.
Amellus.
Tripolium.
- Solidago Virgaurea.
Var. *floribus glomeratis axillaribus.*
- Inula Helenium.
odora.
oculus christi.
dysenterica.
britannica.
pulicaria.
squarrosa.
salicina.
viscosa.
- Arnica Bellidistrum.
Var. *foliis profunde incis.*
Doronicum.
lanigera. *Foliis ovato-lanceolatis per petiolum decurrentibus, summis amplexicaulibus acuminatis inaequaliter dentatis lanuginosis, caule striato lanato, calycinis laciniis lineari-subulatis lanatis. Perennis. Nob.*
- Doronicum austriacum.
Var. *caule unifloro.*
Columnae. *Foliis dentato-angulatis scabriusculis, radicalibus cordato-reniformibus longe petiolatis, inferioribus auriculatis, mediis spatulato-cordatis, summisque ovato-lanceolatis, rotundatis amplexicau-*