

LXXII

Ophrys cordata.
Aristolochia pallida.

Cl. *Monecia*.

Typha minima.
Carex paniculata.
 pallescens.
 extensa.
 polystachya.
 punctata.
 stellulata.
 ovalis.
 umbrosa. *Mich. t. 52. f. 4.*
 ampullacea.
 Oederi.

Quercus robur var. lanuginosa.
 pubescens.

 Frainetto. *Foliis obovatis dilatatis, pinnatifido-sinuatis, subtus pubescentibus, laciniis oblongis pinnato-dentatis obtusis, calycibus fructus haemisphaericis, squamis lanceolatis villosis adpressis.* Nob.

 haliphleos.
 conglomerata.

Pinus brutius. *Foliis geminis rigidis, glaberrimis crassiusculis, strobilis ovatis glabris geminis, pedunculatis, foliis triplo brevioribus, squamis obtusis.* Nob.

Affinis halepensi et maritima; ab illa differt strobilis ovatis, foliis triplo brevioribus, nec conicis, folio subaequantibus; a maritima foliis crassioribus rigidis, strobilis minoribus.

Cl. *Diecia*.

Salix riparia.
 diandra. *Triandra - fr. II. 397*
Hyppophae rhamnoides.

Cl. *Poligamia*.

Andropogon hirtum
Valantia pedemontana.
Atriplex rosea.
Acer neapolitanum. *Foliis subrotundis quinquelobis acutiusculis, subtus pubescentibus, grosse dentatis, corymbis pendulis, pedunculis samarisque pilosis, alis semipatentibus.* Nob. *Planta polygamo-dioica. Ab A. obtusato Will. differt corymbis pendulis, foliis profunde quinquelobis dentatis. Ab opalo diversum corymbis pendulis, foliis subtus glauco-pubescentibus, profunde quinquelobis acutis, alis samararum semipatentibus. Ab opulifolio Vill. differt foliis subtus pubescentibus, samararum alis semipatentibus; ligno compacto evane et. c.*
 monspessulanum.

Cl. *Crittogamia*.

Marsilea natans.
 pubescens. *Foliis quaternis integerrimis pubescentibus, fructibus sessilibus aggregatis villosis.*
 Perennis. Nob.
Blechnum boreale.
Equisetum sylvaticum.