

(564)

t. 159. Spreng. S. V. 2. pag. 57. March. Fl. Tauro-Cauc. 1. p. 264. Guss. pl. rar. p. 141. *Narcissus autumnalis luteus minimus*. Barr. Ic. 984. *N. autumnalis minor*. Clus. hist. 1. p. 164. *Colchicum montanum luteum minus*. Taber. p. 1011. *Amaryllis lutea*. Var. B. Ten. Fl. Nap. t. 1. p. 150.

Descrizione. Bulbo tonacato di circa 10. linee di diametro, foglie lineari lunghe circa 6 pollici cinte alla base da una guaina cilindrica, fiore solitario giallo sessile, spatula monofilla lunga un pollice, corolla imbutiforme col tubo bianco cinto dalla spatula che si prolunga fino alla cima del bulbo, ed il lembo giallo diviso in 6. lacinie lineari lunghe circa 10 linee, tre delle quali sono alquanto più lunghe e munite di una piccola punta.

Luogo natale, ec. Nasce in Abruzzo. Il sig. *Gussone*, l'ha raccolta nell'ingresso del *Piano di 5. miglia*, presso la cappella di *S. Maria della Portella*; fiorisce in settembre *Perenne*. (1).

AGLIO. Vedi Flora Nap. tom. 1. p. 152. n. LV.

1650. AGLIO OLERACEO. Ital. Allium oleraceum. Lat. Ail potager. Franc. *Caule folioso tereti, foliis semiteretibus lineari-filiformibus canaliculatis fistulosis, spatha umbellam laxam bulbiferam longe superante, staminibus simplicibus aequalibus basi coherentibus inclusis*. Lin. Sp. pl. 429. Will. Sp. 2. p. 14. Guss. pl. rar. p. 584. *A. umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus* Hall. De Allio n. 26. f. 2. Bauh. hist. 2. p. 560. *A. seu moly montanum* 5. Clus. pan. 215. 215.

Descrizione. Nella nostra pianta il sig. *Gussone* non ha trovato il germe conico e quasi a trottola e gli stami alterni più lunghi, come si veggono nella pianta della *Flora Germanica* dello *Sturm*. (p. 1. fasc. 54.) Anche in un esemplare ricevuto dal sig. *Gay*, raccolto a *Nyon*, gli stami sono tutti eguali, e gli germi ellittici come nel nostro. I fiori sono simili a quelli dell'*A. pallens*: ora rossi ed ora carnei colla carena di colore più forte, lo stilo sporge alquanto fuori delle corolle.

Luogo natale, ec. È stato raccolto dal sig. *Gussone* nelle praterie soleggiate dei monti di *Abruzzo*, a *Pesco Costanzo*; fiorisce in luglio. *Perenne*.

1651. AGLIO DEL CIRILLO. Ital. Allium Cyrilli. Lat. Ail de Cirillo. Franc. *Scapo nudo persistente, foliis lanceolatis glaucis pallidis serrulatis, umbella fastigiata, spatha bivalvi basi connata, petalis linearibus angustissimis, carinato-triquetris incurvis acuminatis, staminibus monadelphicis, filamentis simplicibus teretibus purpureis petalis longioribus, capsulis turbinatis, bulbo*

(1) In questo medesimo genere; cioè alla *Sternbergia lutea*, bisogna riferire l'*Amaryllis lutea* descritta nel primo tomo di quest'opera alla pag. 150, escludendone la var. B.