

(365)

prolifero, bulbillis longe pedunculatis. Nob. *Allium fragrans.* Cyrill. pl. rar. ic. inedit. Thomas pl. exsicc. ex Apulia. *A. odorum.* Ten. Fl. Nap. Prdr. p. XXI. non Lin; non *A. fragrans.* Vent.

Descrizione. Bulbo solido che porta alla base una corona di piccoli bulbi, foglie tutte radicali al numero di 5 di color turchiniccio pallido, lunghe circa 10 pollici e larghe un pollice, piegate a doccia, finamente seghettate nel margine, scapo alto circa due piedi affatto terete e liscio, ombrella fastigiata composta di 50 a 60 fiori di grato odore, spata bivalve persistente, valve ovate acuminate riunite alla base, petali al più larghi una linea e lunghi 5 linee, carinati, che restano ben lontani l'uno dall'altro e non si riuniscono alla base in un anello comune; essi sono di color verdastro rare volte con leggiera sfumatura violetta ed hanno la carena sempre di tinta più carica, stami semplici più lunghi de' petali con i filamenti violetti riuniti anch'essi alla base in un anello comune, pistillo col germe quasi rotondo, e stilo più lungo di esso, cassole esagone quasi rotonde ovate, semi angolosi neri.

Luogo natale, ec. Nasce ne'campi di *Puglia*, al *Tavoliere*; fiorisce in maggio. *Perenne.*

Osservazione. Questa pianta fu figurata nella tav. 4 del terzo fascicolo del *Cirillo*, rimasto inedito. Molti anni fa il sig. *Thomas* la trovò la prima volta in *Puglia* e me ne inviò un esemplare molto malconcio. Nel 1827 l'ho raccolta al *Tavoliere*, e quindi l'ho coltivata nel Real Orto Botanico. Questa specie ha molta affinità coll' *A. nigrum* e coll' *A. atro-purpureum* del *Kitaib*. Dal primo differisce per le foglie tutte radicali affatto glauco-bianchicce pe' fiori con petali tenuissimi più corti degli stami, e per l'aspetto affatto diverso; dall' *A. atro-purpureum* distinguesi per le foglie non lineari di un bel verde, pe' petali non piani atroporporini, e pe' bulbetti non sessili.

1652. AGLIO NAPOLITANO. Ital. *Allium neapolitanum.* Lat. Ail de Naples. Franc. *Caule basi foliato capsulifero obtuse triquetro, foliis lato-linearibus (4-8 lin.) subtus obsolete carinatis flaccidis, umbella patente, spatha monophylla persistente, petalis oblongis obtusis ecarinatis, stamina simplicia superantibus.* Cyr. Pl. rar. neap. fasc. 1. p. 15. t. 4. Spr. Syst. Veg. 2. p. 56. *A. album.* Sant. et Biv. Cent. 1. p. 16. Red. Lil. p. 500. t. 500. Spr. l. c. p. 58. escluso sinonimo *A. pendulini.* Ten. *A. lacteum.* Sibth. Fl. Grec. 4. p. 21. t. 525.

Flora Napolitana Tav. CXXXVII. f. 1.

Descrizione. Bulbo solido quasi rotondo prolifico, 1-3 foglie verde prato, scapo alto 1-2 piedi angoloso e striato inchinato prima della fioritura, fiori bianchi (12-20) spata semplice risicca persistente, petali più lunghi degli stami, antere rosse.

Luogo natale, ec. Nasce sui cigli de' campi, e sui ritagli umidi di vecchie mura-
glie; fiorisce in marzo. *Perenne.*

Fl. Nap. Tom. III.